

GENGIGEL®

Hyaluronic Acid

Teething

Diş çıkarmانın
keyfine varın...



Formalink®
Sağlık Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.



Diş çıkışma, diş eti mukozasının inflamasyonuna bağlı olarak gelişen sistematik semptomların üzerine, ebeveyn psikolojisinin de eklenmesi nedeniyle özellikle bebekler, anneler ve babalar için sıkıntılı bir süreçtir.¹

“Belirtiler”

- Ağrı,
- Artan salya,
- Diş eti bölgesinde kaşınma, kızarıklık ve şişme
- Yüzde kızarma
- Kulakta kaşınma
- Diş etini kaşıma ihtiyacı ile artan ısrارma ve emme isteği
- Hafif ateş


Tüm bu belirtiler ve ağrı ile bebekte, huzursuzluk ve sinirlilik, katı gıdalar için iştah azalması uykusuzluk görülebilir.^{2,3}




FDA ciddi zarardan dolayı diş çıkışma ağrı tedavisi için kullanılan anestezik içeren ürünlere karşı uyarıyor!^{4,5}

Gengigel® Teething'in bebeklerde ağrı, diş eti şişmesi ve kızarıklık gibi diş çıkışma semptomlarının giderilmesinde lidokain hidroklorür, setilpiridinium klorüre karşı etkili ve güvenli bir seçenek olduğu kanıtlanmıştır.⁶

7. GÜNDE HİÇ SEMPTOM GÖRÜLMEME ORANI



Gengigel® Teething Jel kullanan bebeklerde hem 3. günde, hem de 7. günde uyku kalitesi kontrol grubuna oranla daha iyi idi.⁶



Gengigel® Teething

- ✓ Diş çıkışma semptomlarını gidermeye yardımcıdır.
- ✓ Ağlamayı önemli ölçüde azaltır.
- ✓ İlk uygulama itibarı ile rahatlama sağlar.
- ✓ Uyku kalitesini arttırır.
- ✓ Güvenlidir.
- ✓ Tatsızdır.

- Lidokain veya Benzokain
- Alkol
- Renklendirici
- Şeker
- Yapay tatlandırıcılar
- Gluten
- Laktoz
- Paraben
- SLS
- GDO

İçermez.



“Günde 3-6 kez hafifçe masaj yapınız.”

GENGIGEL®
Hyaluronic Acid

Teething



Farmalink®

Sağlık Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Farmalink Sağlık Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
İçerenköy Mh. Eski Üsküdaryolu Cd.
No:21 Özis Apt. A Blok Dk:1 Ataşehir 34752 - İstanbul
www.farmalink.com.tr

Tel: +90 216 668 00 62
Faks: +90 216 668 00 63
e-posta: info@farmalink.com.tr



RICERFARMA S.R.L.
HUMAN AND VETERINARY

- Referanslar:
1. McIntrye GT, McIntrye GM. Teething troubles? Br Dent J 2002;192:251-5.
 2. Mackin ML, Piedmonte M, Jacobs J, Skibinski C. Symptoms associated with infant teething: a prospective study. Pediatrics 2000;105:747-52.
 3. Enrico C et al,A therapeutic approach to paediatric oral disorders 2016 Edizioni Minerva Medica
 4. Safety Announcement of FDA, 20140626 FDA recommends not using lidocaine to treat teething pain and requires new Boxed Warning
 5. FDA Consumer Health Information / U.S. Food and Drug Administration APRIL 2012
 6. Serban Rosu et al, A randomized, open-label, parallel-groups, multicenter study on the efficacy and tolerability of a non-medicated, patented gel for the relief for teething symptoms in infants, Italian Journal of Dental Medicine 2/2:2017:45-54